# МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

### Исмаилов Ахроридддин Захриддинович

Асситент кафедры Анатомии и микроанатомии Централ Азия медикал Университета, город Фергана

ahroriddin@mail.ru

#### Олимов Иззатилло Одилжон угли

Асситент кафедры Анатомии и микроанатомии Централ Азия медикал Университета, городФергана

В настоящее время в связи с увеличенем числа людей страдающих заболеваниями толстой кишки(рак толстой кишки,полип толстой кишки) и частотой хирургических вмещательств в этом органе предсталяет большой интерес последствии операции рядом расположенных органах,

В частности изменение в морфоструктуре печени. Разрешению в какойто степени этой задачи и посвящено наша работа.

**Ключевые слова** :печень,рак толстой кишки,полип толстой кишки,колэктомия,гепатоциты.

**Введение**. Наши исследования показали, что печень является органом, где имеются крайно сложные взаимоотношения с близ расположенными органами, в частностности с поджелудочной железой, тонкой кишечником, толстым кишечником. В паренхиме печени имеются определенные взаимоотношения лимфатическими и кровеносными сосудами. В литературе по этому вопросу мы не встретили работ, которые широко освещали бы отношение печени и толстого кишечника.

**Результаты исследования**: В опытах после тотальной колэктомии в беспородных крысах мы наблюдали изменение кровеносных и лимфатических сосудов, а также морфофункциональное изменение клеток печени в различных сроках после операции(10 дней,30 дней,60 дней ,90 дней и 120 дней после операции).

**Обсуждение**: Роль печени в процессах пищеварения огромная.В опытах после операции нами установлено, что изменение морфоструктуры гепатоцитов, а также изменение взаимоотношения между лимфатическими и кровонесными сосудами.

**Заключение**: Из вышеуказанного материала следует делать вывод, о том что, изменение формы гепатоцитов связано, при перераспределение крови, как реакция после тотальной колэктомии.

## Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi

## Литература:

- 1. 1.АдлерГ.Болезнь Крона и язвенный колит-М:Гэотар Мед.2001.528с
- 2. Актуальные вопросы хирургического лечения неспецифического Язвенного колита /Ю.Н.Мохнюк,Ю.В.Балтайтис,А.А.Войтенко Идр//Клиническая хирургия,-1982.№2.-С32-36.
- 3. Каншин Н.Н,ГолубцоваЕ.Е..Тотальная колонэктомияс одномоментной илеоректостомией при неспецифическом язвенном колите у детей и взрослых //Хирургия.2004.-№1.-стр.34-37.
- 4. Исмаилов А.З.Морфофункциональное состояние печени после тотальной колэктомии.6-ой Конгресс физиологов Азербайджана. Баку.Азербайджан.октябр 30-31,2023 г.стр.112.
- 5. Куприянов В.В.Лимфатические и кровеносные пути(микроциркуляция в эксперименте и клинике).Новосибирск,1976 г.