

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚУМЛИ ЧЎЛ ЎЛКАЛАРИДА МИЯ
ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЁШ ВА
ЖИНСНИНГ АХАМИЯТИ**

Киличев И.А., Матёкубов М.О., Матризаев М.Б.
TTA Урганч филиали

Маълумки, инсультларнинг келиб чиқишига сабаб бўладиган омиллар конституциявий яъни ўзгармас (модификацияланмайдиган) ва ўзгарувчан (модификацияланадиган) турларга бўлинади. Ўзгармас хавф омиллари (ёш, ирсият, жинс, ирқ) ўзгарувчан (чекиш, семизлик, алкоголизм, қон томирлари атеросклерози, гиперхолестеринемия, юрак ритмининг бузилиши, артериал гипертензия ва бошк.) хавф омилларида ўз таъсирини ўtkазади деб ҳисобланади.

Инсон ҳаётининг турли даврларида организмнинг функционал хусусиятларига кўра, организмга таъсир қилувчи антропосоциал таъсиrlар, гендер фарқлар, ўзгарувчан хавф омиллари, турли ёш гурухларидаги эркак ва аёлларда ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, буни цереброваскуляр касалликларни даволаш ва профилактика жараёнларида эътиборга олиш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқот мақсади- Мия инсультлари сабаблари ва хавф омилларини *турли ёши гурухларида жинсга боғлиқлик хусусиятларини ўрганиши*.

Материал ва методлар: тадқиқот БМҚАЎБ ташхиси билан РШТЁИМ Хоразм филиалида стационар даволанган 348 та беморда ўтказилди. Шундан эркаклар 209 (60%), аёллар – 139 (40%). Беморларнинг ўртача ёши 57,3 (эркаклар – 56,7, аёллар – 58,2) ни ташкил қилди.

Тадқиқот натижалари ва мухокамаси: Тадқиқотлар шуни кўрсатдик мия инсульти кўпинча 60-70 ёш (43,4%) ва 45-59 ёшли (40%) bemорларда кузатилиб, меҳнатга яроқли (20-59) ёшдагиларда 52,6 foизни ташкил қилди.

Эркакларда кўпроқ 45-50 ёшда (43,5%) кузатилиб меҳнатга яроқли ёшдагиларда 55,9 foизни ташкил қилди.

Аёлларда эса кўпроқ 60-74 ёшда (46,8%) кузатилиб, меҳнатга яроқли ёшдагиларга нисбатан 60 ёшдан катталар устунлик қилди (52,6%).

Инсульт турига боғлиқ холда тахлил қилганимизда мия инфаркти 284 (81,6%), мияга қон қўйилиши 47 (13,5%) ва субарахноидал қон қўйилиш 17 (4,9%) bemорда кузатилгани маълум бўлди.

Мия инфаркти 45-59 ёшда 41,5% ва 60-74 ёшда 41,5% кузатилиб, шундан 59 ёшгача бўлганлар 54,4 foизни ташкил қилди.

Мияга ва субарахноидал бўшлиқга қон қуиши эса 45-59 ёшда 51,1% ва 60-74 ёшда 58,8% кузатилиб, шундан 50 ёшдан катталар 53,2 фоизни ташкил қилди.

Аёлларда мия инфаркти асосан 60-74 ёшда (47,0%) кузатилган ва мос равища 60 ёшдан катталар сони устунлик қилди. Мияга ва субарахноидал бўшлиқга қон қуиши хам 60 ёшдан катталарда кўп учраган(мос равища 46,5% ва 57,1%).

Эркакларда эса аёллардан фарқли равища ёшроқ пайтида кўп кузатилган 45-59 ёшда (45%), меҳнатга яроқлилик даврида 58,2 фоизни ташкил қилган. Мияга ва субарахноидал бўшлиқга қон қуиши эса аёллардаги каби кўпроқ 60 ёшдан кейин кузатилган(мос равища 57,9% ва 60,0%).

Мия инсультларининг асосий сабабчиси гипертония касаллиги бўлиб 56,4% ни, атеросклероз 21,2% ни, гипертонияни атеросклероз билан қўшилиб келиши 12,8% ни, ревматизм, мия томирлари аневризмаси, қандли диабет ва бошқалар 9,6% ни ташкил қилди.

Эркакларда хам аёлларда хам гипертония касаллиги кўпроқ 45-59 ёшда кузатилган (мос равища 56,6% ва 49,3%). Гипертонияни атеросклероз билан қўшилиб келиши иккала жинсда хам 60 ёшдан кейин кўп кузатилган.

Шундай қилиб текшириш натижасида мия инсультлари келиб чиқишида ёш ва жинсга боғлиқ хусусиятлар аниқланди:

- **мия инсультлари кўпроқ эркакларда кузатилиб -60% ва улар меҳнатга лаёқатли ёшда касалланишган** (59 ёшгача, 55,9%), аёлларда эса кўпроқ 60 ёшдан кейин кузатилар экан– 52,6%;
- мия инсультининг ишемик тури кўпроқ **меҳнатга лаёқатли ёшда кузатилса** (54,5%), геморрагик инсульт 60 ёшдан кейин (53,2%);
- мия инфаркти аёлларда кўпроқ 60 ёшдан кейин учрайди, эркакларда эса **меҳнатга лаёқатли ёшда – 58,2%**;
- геморрагик инсульт эркакларда хам аёлларда хам 60 ёшдан кейин кўп кузатилар экан;
- **мия инсультларининг асосий сабабчиси меҳнатга лаёқатли ёшда гипертония касаллиги бўлиб, 60 ёшдан кейин** атеросклерозни гипертония билан қўшилиб келиши хисобланади;
- турли ёш гурухларидаги мия инсультларида жинснинг ахамияти катта бўлиб, буни клиник амалиётда эътиборга олиш зарур.