

**КЕНГ ТЕРМИК КУЙГАН БЕМОРЛАРДА ЮҚОРИ ОШҚОЗОН-  
ИЧАК ТРАКТИНИНГ ЎТКИР ЭРОЗИВ ВА ЯРАЛИ  
ШИКАСТЛАНИШЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ**

*Абидов Ўткир*

*Бухоро Давлат Тиббиёт Институти*

*Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро  
филиали*

**Аннотация:** Мақолада кенг термал куйишлар билан оғриган беморларнинг ошқозон-ичак трактининг юқори қисмида ўткир эрозив ва ярали жараёнларнинг олдини олиш кўриб чиқилади. У кўпинча қон кетиш ва полиорган етишмовчилиги каби оғир оқибатларга олиб келадиган ушбу асоратларнинг юқори частотасини муҳокама қилинади. Эндоскопик тадқиқотлар натижасида куйишдан кейинги яраларнинг эрта ривожланиши, уларни консерватив усуллар, жумладан, омепразол каби протон помпаси ингибиторлардан фойдаланиш билан даволаш батафсил ёритилган. Тадқиқот шунингдек, ушбу яраларнинг патогенезини тушунишнинг муҳимлигини таъкидлайди, уларнинг ривожланишида кислота ишлаб чиқаришнинг кўпайиши ва ошқозон моторикасининг кечикиши ролини таъкидлайди.

**Калит сўзлар:** ўткир эрозив ва ярали яралар, юқори ошқозон-ичак тракти, термик куйишлар, гемодинамик бузилишлар, ошқозон моторикаси, протон помпаси ингибиторлари.

**Долзарблиги.** Ошқозон-ичак трактининг ўткир эрозив ва ярали шикастланиши қўпинча куйишдан кейин беморларда асоратлар шаклида юзага келади. Қон кетиш шаклида ўткир яраларнинг асоратлари беморларнинг 18-23 % да учрайди [1]. Куйган беморларда ҳатто паст интенсивликдаги қон кетиш ҳам умумий ҳолатни кескин ёмонлаштиради, бу умумий заифлик, летаргия, терининг рангпарлиги ва гемодинамик бузилишлар билан намоён бўлади. Баъзи ўткир яралар ва эрозиялар мустақил чандик ва эпителизацияга қодир, аммо уларнинг клиник кўриниши ёмон ифодаланган [1, 2, 3].

Мутлақ аксарият ҳолларда асоратланмаган ўткир эрозия ва яралар, ўзига хос клиник кўринишларсиз, тан олинмайди ва фақат отопсияда аниқланади. Патологоанатом кўра, шиллиқ кават ўткир яраси полиорган етишмовчилиги ривожлантириш натижасида, тананинг куп микдорда куйишидан кейин вафот этганларнинг 20-50% да аниқланади.

**Эндоскопик тадқиқотлар материаллари.** Эндоскопик текширув маълумотларига асосланиб, биз кенг куйган беморларда кейинги 3-5 кун ичида

ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллиқ қаватининг ўткир яраси ривожланишини аниқланди. Дастребки даврда шиллиқ қаватдаги ўзгаришлар рангпарлик ва гиперемия ўчоқлари ўртасида алмаштирилган. Бир кундан кейин диаметри 1-2 мм гача бўлган петехия ва сирт эрозиялари содир бўлди ва 46-48 соатдан кейин ошқозон шиллиқ қаватининг шикастланиш ҳажми сезиларли бўлди. Қулай шароитларда ошқозон шиллиқ қавати 10-14 кундан кейин тикланди ва эрозия йўқолди. Бироқ, баъзи оғир bemорларда улар 20-24 кунгача давом этди ва кўпинча қон кетиш билан асоратланди.

Беморларнинг 20-25 фоизида давом этаётган қон кетиш белгилари кузатилган. Шу билан бирга, кўпинча диаметри 1-2 мм гача бўлган геморрагик турдаги кўплаб эрозиялар аниқланди.

Эндоскопик тадқиқотлар натижаларини таҳлил қилганда, эрозив ва ярали шикастланишлар кўпинча (67%) ошқозонда, бироз камроқ (43%) ўн икки бармоқли ичак ва қизилўнгачда (18%) локализация қилинган. Стресс сабабли яраларини шакллантириш вақти ҳақидаги савол қизиқиш уйғотади, чунки "танқидий давр" таърифи шифокорларга ўз кучларини қон кетишини самарали ташхислаш ва олдини олишга йўналтиришга имкон беради. Ошқозон яраси вақти уни келтириб чиқарадиган сабаблар ва механизмларга боғлиқлиги аниқланди. Ошқозоннинг кислота ҳосил қилиш функциясини ҳар томонлама баҳолаш шуни кўрсатдики, дастребки 10 кун ошқозоннинг кислота ҳосил қилиш функциясини максимал даражада рағбатлантиради, унинг "чўққиси" эса 3-5-кунларда, яъни.енг еҳтимолий яра шаклланиши даврида.

Кундалик pH-метри маълумотлари кенг куйган bemорларда ошқозоннинг кислота ҳосил қилувчи функцияси ҳолатини тушунишни сезиларли даражада чуқурлаштириди. Жароҳатдан кейинги 1-куни, 81% ҳолларда, ошқозон танасида  $pH < 1$  қайд етилган, яъни еркин хлорид кислота жуда юқори ишлаб чиқарилган.

Куйган bemорларда операциядан кейинги эрта даврда ошқозон мотор функциясини ўрганиш шуни кўрсатдики, ошқозон ҳаракатининг 1-2 кунида барча bemорларда йўқ. 3-куни паст амплитуда тўлқинлар дақиқада 3 та қисқариш частотаси билан пайдо бўлади, бу ошқозондан етарли эвакуация қилишни таъминламайди. 4-куни даврий восита фаолияти пайдо бўлади, аммо қисқариш тўлқинларининг амплитудаси нормал даражага етиб бормайди. Клиник жиҳатдан bemорлар ичак перисталтикаси ва газ чиқиши билан аниқланади. 6-8-кунга келиб, куйиш касаллигининг асоратланмаган курси билан ошқозонни эвакуация қилиш функцияси тикланди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кислота ишлаб чиқаришнинг кўпайиши ошқозон моторикасини яхшиланиш фонида содир бўлади.

Перисталтик фаолликка боғлиқ бўлган кислотали ошқозон таркибини эвакуация қилишнинг бузилиши ошқозон шиллиқ қаватига кислота-пептик

омилнинг узоқ вақт таъсир қилишига олиб келади, бу бошқа сабаблар билан биргаликда ошқозон яраси хавфини сезиларли даражада оширади.

Овқат ҳазм қилиш тизимининг травматик стрессга сезиларли реакцияси эрта ҳақиқий стресс яраларининг шаклланишига асосланади, бу юқори ошқозон-ичак шиллиқ қаватининг барча яраларининг тахминан 80% ни ташкил қиласди. Колган 20% беморларда ошқозон яраси юрак-қон томир, буйрак ва нафас олиш етишмовчилиги кўринишидаги кўйиш касаллигининг мураккаб курси билан узоқроқ даврда шиллиқ қават дистрофияси босқичида, шунингдек полиорган етишмовчилик ривожланишига олиб келадиган йирингли ва септик асоратлар билан юзага келади.

Бизнинг маълумотларга кўра, юқори ошқозон-ичак трактининг эрозив ва ярали шикастланиш бўлган беморларнинг 92% гача консерватив усуслар билан даволанган. Жарроҳлик даволаш фақат ковак органнинг тешимиши, Эндоскопик гемостаз усусларининг самарасизлиги билан қўп ёки доимий такрорий қон кетиши кўринишидаги асоратлар учун амалга оширилди. Биз протог помпа ингибиторларини, хусусан омепразолни кенг қўлладик. Кучсиз ишкор муҳитли бўлган омепразол нейтрал pH да самарасиз. бироқ, париетал ҳужайралар каналлари кислотали муҳитида H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-АТФаза мембранныни қайтариб бўлмайдиган даражада пасайтирувчи фаол метаболит сулфенамидга айланади. Омепразолнинг сүлфенамидга айланиши тез содир бўлади (2-4 дақиқадан сўнг), у базал ва тирнаш хусусияти берувчи HCl секрециясини самарали бостиради, ошқозон секрециясининг умумий ҳажмини камайтиради ва пепсин чиқарилишини пасайтиради. Ҳозирги вақтда ушбу гурухнинг дори-дармонлари антисекретор фаолликка эга, уларнинг кучи бошқа дорилар билан таққосланмайди. Плазмадаги омепразолнинг максимал концентрацияси оғиз орқали юборилгандан 1-3 соат ўтгач содир бўлади. 18 соат давомида ферментатив синтезни бостириш орқали дорилар дозадан қатъи назар, кислотани бостирувчи таъсирнинг 24 соатлик давомийлигини таъминлайди [4, 5, 6].

Кўйиш жароҳати бўлган беморларда ошқозон шиллиқ қаватининг ўткир яраси патогенези ҳақидаги янги ғоялар шиллиқ қаватнинг ҳимоя хусусиятларига самарали таъсир қилиши, хусусан, ундаги микросиркуляция ва метаболик касалликларни тузатиши, шунингдек травмадан кейинги иммуносупрессияни йўқ қилиши мумкин. Шу муносабат билан антиоксидант ва антигипоксантик хусусиятларга эга дори - актовегин бизнинг эътиборимизни тортади.

Препарат қўп функцияли таъсирга эга, бу тўқималарда, хусусан, ошқозон шиллиқ қаватида гипоксия шароитида эндотоксикоз ва қон йўқотиш билан боғлиқ метаболик касалликларни бартараф етишга имкон беради. У, қоида тариқасида, кунига 250 мл гача 10% эритмадан томир ичига томчилатиб юбориш

шаклида қўлланилади. Ушбу препарат ошқозон шиллиқ қаватининг хужайраларининг ошқозон ширасининг протеолитик таъсирига чидамлилигини кескин оширади.

Шундай қилиб, юқори ошқозон-ичак трактининг эрозив ва ярали шикастланиши куйиш касаллигининг энг кенг тарқалган асоратларидан биридир. Кон кетиш шаклида ўткир яраларнинг асоратлари юқори леталлик билан бирга келади. Патогенезнинг етакчи омилларидан бири бу кислота-пептик таъсири сезиларли ва доимий ўсиши. Куйиш касаллигига ошқозоннинг эрозив ва ярали шикастланишларининг олдини олишнинг етакчи компоненти замонавий антисекретор дориларни эрта, биргаликда қўллашдир.

#### **Адабиётлар:**

1. Григорьева Т.Г. Ожоговая болезнь. //Международный медицинский журнал, 2000. Т.6,-№ 2.- С.53-60
2. Лавров В.А., Виноградов В.Л. Ожоговый шок: патогенез, клиника, лечение./Научный практический журнал Института хирургии им. Вишневского А.В. РАМН. 2000.-№2.-С.1-5.
3. Василенко В.Х, Гребнев А.Л., Шептулин А.А. Язвенная болезнь: (Современные представления о патогенезе, диагностике, лечении). АМН СССР. М.: Медицина, 1987.
4. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С. Лепахин, В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия.— М. 2000.- 540 с.
5. Исаков В.А. Ингибиторы протонного насоса: их свойства и применение в гастроэнтерологии. М.: 2001. - 304 С.
6. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения /Под ред. В.Т. Ивашкина.- М. 2003.- 1046 с.
7. Abidov U. O., Obidov I. U. A Rare Case from Practice: Strangulated Perineal Hernia //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 28-32.
8. Abidov U. O., Obidov I. U. Hepaticofasciolias (Fasciolosis) as a Cause of Mechanical Jaundice in a Woman (Case Study) //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 38-41.
9. Abidov U. O., Obidov I. U. Appendicular Giant Mucinous Neoplasms (Case Report) //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 33-37.
10. Абидов У. О. и др. ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 623-625.

- 11.Нурбабаев А. У., Абидов У. О. Комплексное лечение больных с синдромом механической желтухи //Биология и интегративная медицина. – 2020. – №. 6 (46). – С. 96-102.
- 12.Abidov U. O., Khaidarov A. A. MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MECHANICAL JAUNDICE //Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia. – 2022. – Т. 22. – С. 6.
- 13.Abidov U. O. Results of Treatment of Patients with Obstructive Jaundice //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 370-376.
- 14.Абдурахманов, М. М., Обидов, У. У., Рузиев, У. У., & Мурадов, Т. Р. (2020). Хирургическое лечение синдрома механической желтухи. Журнал теоретической и клинической медицины, 1, 59-62.
- 15.Haydarov, A. A., Abdurakhmanov, M. M., Abidov, U. U., Sadiev, E. S., Mirzaev, V. I., & Bakae, M. I. (2021). Endoscopic interventions and ozone therapy in the complex treatment of patients with mechanical jaundice and cholangitis with choledocholithiasis. Journal of Natural Remedies, 22(1 (1)), 10-16.
- 16.Уроков, Ш. Т., Абидов, У. У., Хайдаров, А. А., & Хаджаев, К. Ш. (2019). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛИГИРОВАНИЯ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. Новый день в медицине, (4), 316-320.
- 17.Utkir, A. (2024). TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE ABDOMINAL CAVITY WITH ANTIMICROBIAL THERAPY IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(5), 81-84.
- 18.Abidov Utkir. (2024). PREVENTION OF ACUTE EROSIVE AND ULCERATIVE LESIONS OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT IN PATIENTS WITH EXTENSIVE THERMAL BURNS. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(5), 85–87.
- 19.Utkir, A. (2024). PREVENTION OF POSTOPERATIVE LOCAL COMPLICATIONS AFTER ALLOHERNIOPLASTY IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(5), 86-88.
- 20.Utkir, A. (2024). ENDOSCOPIC HEMOSTASIS FOR GASTRODUODENAL ULCERATIVE BLEEDING. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(5), 149-154.
- 21.Utkir, A. (2024). PERFORATION OF AN ATYPICALLY POSITIONED DUODENAL ULCER IN A PATIENT WITH CONGENITAL FUNNEAL CHEST DEFORMITY. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(5), 155-158.

22. Abidov, U. O. (2023). EIN SELTENER FALL AUS DER PRAXIS: STRANGULIERTE PERINEALE HERNIE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(22), 73-77.
23. Oktamovich, A. U. (2023). GALLENSTEINKRANKHEIT BEI SCHWANGEREN: DIAGNOSE, KOMPLIKATIONEN UND BEHANDLUNG. Scientific Impulse, 2(15), 587-595.
24. Abidov, U. O. (2023). HEPATIKOFASZIOLOSE (FASZIOLOSE) ALS URSACHE FÜR MECHANISCHEN IKTERUS BEI EINER FRAU (FALLSTUDIE). INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(22), 78-84.
25. Obidov, I. U. (2023). RIESIGE MUZINÖSE NEOPLASMEN DES APPENDIX (FALLBERICHT). INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(22), 85-89.