

HOMILADORLIK VA COVID-19 INFEKSIYASI

*Umirjonova Shohsanam Valixon qizi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 3-kurs
Akusherlik va ginekologiya*

Kirish. Hozirgi vaqtida eng dolzarb muammo bu Sars-cov-2 yangi korona virusi keltirib chiqaradigan va JSST tomonidan 2020 yil 11 martda pandemiya deb e'lon qilingan infektsiya. Xavfli guruhlardan biri homilador ayollardir, shuning uchun butun dunyo bo'ylab shifokorlar ushbu infektsiyaning homiladorlik, tug'ish va perinatal natijalarga ta'sirini tahlil qilishga tobora ko'proq e'tibor berishmoqda.

Xorijiy adabiyotlarni tizimli ko'rib chiqishga kiritilgan 100 000 homilador ayollar haqidagi ma'lumotlar 5,3% hollarda vertikal yuqtirish imkoniyatini va 8% hollarda Covid-musbat yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tug'ilish darajasini ko'rsatdi. Perinatal natijalarning eng tez-tez uchraydigan asoratlari homila distress sindromi (26,5-30,0%), kam vazn (25,0%), neonatal asfiksiya (1,4%) hisoblanadi. Bolalarni intensiv terapiya bo'limiga yotqizish 43% hollarda talab qilinadi, perinatal o'lim esa 0,35-2,2% ni tashkil qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Homiladorlik davrida koronavirus infektsiyasi bilan kasallangan bemorning yangi tug'ilgan chaqaloqning holatiga ta'sirini o'rganish.

Materiallar va usullar. Toshkent Shahar 9-sonli tug'ruq kompleksi 1-va 2-akusherlik bo'limlarida 480 ta tug'ilish tarixini retrospektiv tekshirish o'tkazildi, unda 67 bemor, rekovalesent Covid-19 shundan 21 bemor homiladorlik va tug'ruq fiziologik o'tkizgan (nazorat guruhi).

Natijalar. 67 nafar bemor homiladorlik davrida koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganligiga qarab 3 guruhga bo'lingan: I trimestrda - 5 kishi, II trimestrda - 11 kishi, III trimestrda - 51 kishi. O'rtacha yoshi 29,5 yosh. Ayollarning 68,6 foizida tug'ruq tabiy tug'ruq yo'llari orqali, 31,4 foizida Kesarcha kesish bilan tug'ilgan. Platsentaning gistologiyasi bemorlarning 8,9 foizida gipoplaziya, 8,9 foizida yallig'lanish, 2,9 foizida bazal desiduit aniqlangan. Jami 67 ta yangi tug'ilgan chaqaloq muddatga yetib tug'ilgan. Tana vaznining o'rtacha qiymati -3120 g, bo'y - 51,9 sm, Apgar shkalasi: 1 daqiqada - 7,2 ball, 5 daqiqada - 8,3 ball. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 35,8 foizida quyidagi perinatal asoratlar aniqlangan: kichik ateletkaz - 17,9%, morfofunktional yetuklik - 14,9%, tug'ma pnevmoniya - 10,4%, yangi tug'ilgan chaqaloqning gemolitik kasalligi - 7,4%, izolyatsiya qilingan trombotsitopeniya, % 5-3,9%. - 4,4%. Eng ko'p asoratlar, ya'ni 22,3% onalarida koronavirus infeksiyasi homiladorlikning uchinchchi trimestrida, ikkinchi va birinchi trimestrlarda esa mos ravishda 7,4 va 6,1% bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda aniqlangan. Homiladorlik va tug'ishning fiziologik kursi bo'lgan 21 ayoldan iborat guruhda yangi tug'ilgan chaqaloqning tana vaznining o'rtacha qiymati va Apgar ko'rsatkichi tadqiqot guruhiga qaraganda ancha yuqori edi.

Xulosa. Shunday qilib, homiladorlik paytida covid-19 bilan kasallangan ayollarda perinatal asoratlarni rivojlanish xavfi nazorat guruhiga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan: 35,8 foizda asosan nafas olish tizimining asoratlari aniqlangan, bu esa ularning holatini qo'shimcha o'rganish va monitoringini talab qiladi.