



Қайрағоч баргхўрининг (GALERUCELLA LUTEOLA MULL) Хоразм вилояти шароитида тарқалиши.

Б. Раматов. УрДУ Ургенч.

Аннотация: Мазкур мақолада Хоразм вилояти шароитида қайрағоч баргхўр қўнғизининг тарқалиши ва ривожланиши динамикаси кўрсатилган.

Аннотация : В данной статье показано распространение и динамика развития карпового листоеда в Хорезмского областях.

Annotation: This article shows the distribution and development dynamics of the carp leaf-eating beetle in Khorezm region.

Калим сўзлар: Қайрағоч, зааракунанда, личинка, тухум, имого, авлод, оила.

Ключевые слова: Личинка, вредитель, личинка, яйцо, образ, поколение, семья.

Key words: Larva, pest, larva, egg, image, generation, family.

Қайроғоч баргхўри (GALERUCELLA LUTEOLA MULL) бутун Ўзбекистоннинг қайроғоч дарахти ўсадиган худудида тарқалган зааракунанда хисобланади. Айниқса Ўзбекистоннинг шимолий вилоятларида кенг тарқалган. Бу заракунанда ахоли яшайдиган жойларда ва шахар ичида ўсадиган қайроғоч ўсимликларини кўпроқ заарлайди. Заракунандани ўсимликка зарар келтирадиган даври бу личинка ҳолати ҳисобланади. Личинкалар ўсимлик баргининг юмшоқ қисмини еб пастки эпидермисни ва томирларни қолдиради. Қайрағоч баргхўрини ёппасига кўпайган йиллари шаҳар ичидаги қайрағочлар оқ рангга кириб қолади. Натижада қайрағочни иккиламчи зааракунандалар билан заарланишга мойиллигини ортишига сабабчи бўлади. Жорий или шаҳар ичида ва атрофида ўсаётган қайрағоч дарахтлари қайроғоч баргхўрлар билан кучлироқ заарланишига сабабчи бўлди. Дарахтларнинг ёғочларини заарловчи зааракунандалар (*Cerambycidae*) оиласи 15000 дан ортиқ турни ўз ичига олади. Уларнинг личинкалари дарахтни танасида, пўстлоқлар остида ва бошқа ерларда ҳаёт кечиради.



Қўнғизлари баргларга 40 тадан тўп-тўп килиб тухум кўяди. Тухумлари тўксарик рангда. Қўнғизлар июн ойининг иккинчн ярми, июл ойининг биринчи ярмида биринчи авлод тухумларини кўяди. Тухум кўйган қўнғизлар июл ва август ойларида нобуд бўлади. Табиатда қўнғизларнинг биринчи авлоди август охирида пайдо бўлади ва сентябрга бориб қўнғизлар қишлиш учун дарахт ёриқларига кириб кетади. Шундан қилиб қайрогоч баргхўри бир йил давомида икки авлод бериб кўпаяди.

Адабиётлардаги маълумотларга кўра 1936 йил Тошкент шахридаги қайрагоч дарахтларига зааркунанда катта зарар келтирган.

1917 йилда эса шахардаги барча парк ва хиёбонлардаги дарахтларни умуман кучли заарлаган.

Қайроғоч баргхўри зааркунандасининг бу тури Ўрта Осиёда кенг тарқалган. П.П.Архангельский маълумотларига кўра қайрагоч баргхўри Ўзбекистоннинг аксарият туманларида аникланган ва қайрагоч дарахти ўсган текислик ва тоғ зоналарининг хамма жойида учрайди.

Дарахт зааркундаларини ўрганиш борасида бир қатор тадқиқот ишлари маълум. (Гусев, 1964., 1987., Шербакова, 1980., Василев, 1984., Жарков, Тварадзе 1984., Ганиев, 1986., Кадыров., 1988, 1989.).

Шу сабабли қайроғоч баргхўр қўнғизининг ривожланишини ўрганиш юзасидан Хоразм вилоят туманларида изланишлар олиб бордик. Изланиш натижаларига кўра 2023 йил қайрагоч баргхўр қўнғизлари апрел ойининг иккинчи ўн қунлигидан бошлаб учиб чиқа бошлади. Апрел ойининг учинчи ўн қунлигига улар ёппасига тухум қўя бошлади. Май ойининг биринчи ўн қунлигидан бошлаб уларнинг тухумлари сони, личинкалар кўплиги ва янгидан қўйилган тухумлар сонига нисбатан кўп бўлганлиги сабабли камая борди. Қўнғиз тухумлари дарахтларда июл ойининг иккинчи ўн қунлигигача учради.



Қайрағоч баргларида май ойининг биринчи ўн кунлигидан бошлаб личинкалар пайдо бўла бошлади. Личинкалар сони май ойининг иккинчи ўн кунлигига дарахт баргларида 100 дан ошиб максимал даражага етди. Май ойининг учинчи ўн кунлигига уларнинг сони кескин камайиб кетиши кузатилди. Камайиш жараёни июн ойининг биринчи ўн кунлигигача давом этди. Июн ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб яна личинкалар сони орта борди. Июл ойининг биринчи ўн кунлигидан личинкалар сони камая бошлади. Июл ойининг учинчи ўн кунлигига личинкалар дарахт баргларида учрамади.

Қайрағоч дарахтлари баргларида баргхўр қўнғизлар сонининг ўзгариши июл ойининг учинчи ўн кунлигидан бошлаб учрамаслик сабабларини ўрганиш зарур. Бизнинг фикримизча бу ходиса дарахтнинг физиологик ҳолати ва дарахтда энтомофагларнинг сонини ўзгариши билан боғлиқ. Бу борада лойиҳанинг кейинги босқичларида изланишлар олиб борилади.




Қайрағоч баргхүр құнғизларини ривожланиш фенологик календари.

Авлодлари	Ойлар																	
	Апрел			Май			Июн			Июл			Август			Сентябр		
декадалар	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Кишлоудан чиққан құнғизлар	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	*	*	*	*	*	*
Биринчи авлод	-	-	-	-	*	0	0	0

+ қишлоудан чиққан құнғизлар, ... тухум, - личинкалар, 0 - ғумбак, * құнғизлар



Қайрағоч баргхүр қүнғизининг ривожланиши 2023 йил





Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алимухамедов С. Н., Ходжаев Ш. Т. – - Фўза заараркунандалари ва уларга қарши кураш. Тошкент. 1980.
- 2.Б. Раматов, Р. Рўзметов, А. Машарипов Сўқир қандалалар(miridae) ва уларни Хоразм вилояти шароитида тарқалиши. Республика микёсидаги анжуманда XXI-аср – интелектуал авлод асри Ёш олимлар ва талабаларнингхудудий илмий-амалий анжумани материаллари. Ал-Хоразмий номли Урганч Давлат университети 13-14 июн 2013й
- 3.Раматов Б, Р. Рузметов, А. Машарипов Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш бўйича услубий қўлланма 110 бет УрДУ нашрёти 2012 й.